

ģÒôòÉůµùÔ

DZ ŰÒυòÉůµùÔ ŮøÎαĖ øůŘÔ È πÉÒ πòÒůÒŭÒφùòα ÒÉêÒÎÒµÉêØ ŭòαůŰÈòÉùŰÈŰα πÒυ µπÒòŮø Îα αÎαπŰυŘèŮø µæůα ůŰα ΘαÌÆůůÉa ÕαŰαφÛÂÉa. ÃÎα παòÆŭŮÉÂµα ŮøÎαĖ ŰÒ ΘαÌÆůůÉÒ DzòÒůŰαŰŮυùµŮÎÒ

DzøÎŬêŬÔ 1. ǮæůÈ ŬÌÊŮôŰÊêØ ϕŬòŬÂŘÂØ ŰŘÎ ůÈµŬÎŰÊêùŰŮòŘÎ ŮÊ

Dzǫǯǥǭǥǵ 1				
	ǭdzǪDzǫΔǥ (ǥÎŰǿêυȍα)		ǭǨǯǵdzǫǭǪ ǭǨǭǥǯǪ	
	max	Min	Max	M

Űȍυ ’80), ŮπÊφÆÎŮÊα πȍυ αÎŰÊůŰȍÊȑŮǿ ůŰȍ 12% πŮȍǿπȍυ Űȍυ ůυÎùȉȍυ Űȍυ ǬȍȍÊÎèÊαêȍÛ.

ǵα


20°
10°
3
50°

Dzoů Ů Ê ŭ ω ν ί α

Ǫ DzÒůůÊŭŘÎøα (*Posidonia oceanica*) ůøÎαÊ æÎα ůÎŭÈµÊêù ůøŭÒÔ ŰÈÔ ǮůůÒÂůøÒυ ŰůòÆůŰÊαÔ ÒÊêÒÌÒÂÊêØÔ ůÈµαůøαÔ

ŰŘÎ πυòØÎŘÎ àαůíůŰÈêŮ ůŮ υπÆòŘÒυůŮÔ πòÒŰÆůŮÉÔ ÂÉα ŰÈÎ πòÒůŰαůíα ŰÒυ ǪÒòÉÎèÉα

ÃÎα πòùůèŮŰÒ

DzÒÌÊŰÊêÆ µæŰòŬ ÂÊŬ ŪŬÌÆůůÊŬ ǬŬŰŬűÛÂÊŬ

DZ ǬÒòÊÎèÊαêùÔ êùÌπÒÔ ŮøÎαÊ µÊα ŮυαøůèÈŰÈ êÌŮÊůŰØ èÆÌαůůα πÒυ ÊêαÎÒ 9

ÒαŰαφÊ

êαΰαφυÂǿŘÎ απÒΰΰÌΰǿ ǽÎα ÒυůÊαůΰÊêù àØμα ÂÊα υÂÊΰǿÔ èÆÌαůůΰÔ êαÊ Ŏ μ

DzŬòÆòŰÈµŬ

Ʒøα απù ŰÉÔ ůÈμαÎŰÉêæÔ ŮπÉπŰûůŮÉÔ ŰÈÔ υπŮòαÌøŮυůÈÔ ŮøÎαÉ È Ůπøŭòαů È πÆÎŘ ůŰÈÎ ŰòÒφÉêØ

ĞǫĞǪǫDZũdzg ūǫg

[1] Browman H.I. & Stergiou K.I. (eds). 2004. Marine